Amino Fertility Bolus

Bolus voor melkvee ter ondersteuning van de voorbereiding op bronst en reproductie / Bolus pour vaches laitières afin de soutenir la préparation à l'œstrus et à la reproduction
Bolus für Milchkühe zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion / Bolus for dairy cows to support the preparation for oestrus and reproduction

Mineraal dieetvoeder voor melkvee
Specificatie met betrekking tot de situaties waarin het gebruik van dit voeder geschikt is: ter ondersteuning van een optimale vruchtbaarheid. Bètacaroteen, ook bekend als provitamine A, is van groot belang voor de vruchtbaarheid bij rundvee.
Gecontroleerde afgifte gedurende een periode van ong. 40 dagen. Voor zover van toepassing moet worden vermeden dat toevoegingsmiddelen uit andere bronnen waarvoor een maximumgehalte is vastgesteld gelijktijdig worden toegediend met die van een bolus.

Aliment diététique minéral pour vaches laitières
Indications sur les situations dans lesquelles l'utilisation de l'aliment est appropriée: pour soutenir la fertilité optimale.
Le bêta-carotène, également connu sous le nom de provit. A, revêt une grande importance pour la fertilité du bétail.
Libération contrôlée sur une période d'environ 40 jours.
Le cas échéant, il faut éviter que des additifs provenant d'autres sources pour lesquels une limite maximale a été définie soient administrés simultanément à ceux d'un bolus.

Mineralisches Diätfutter für Milchkühe
Hinweise zu den Fällen, in denen eine Verwendung des Futtermittels angebracht ist: zur Unterstützung eine optimale Fruchtbarkeit.
Beta-Carotin, auch als Provitamin A bekannt, ist für die Fruchtbarkeit bei Rindern von großer Bedeutung.
Kontrollierte Freisetzung über einen Zeitraum von ca.40 Tage.
Sofern zutreffend, muss verhindert werden, dass Zusatzstoffe aus anderen Quellen, für die ein Höchstgehalt festgelegt wurde, gleichzeitig mit solchen aus einem Bolus verabreicht werden.

Mineral dietary feed for dairy cows
Guidance on the situations in which the use of the feed is appropriate: to support an optimal fertility.
Beta-carotene, also known as provitamin A, is of great importance for fertility in cattle.
Controlled release over a period of approx. 40 days.
Insofar as applicable additives from other sources of which a maximum level has been set must be prevented from being administered simultaneously with that of a bolus.

Voeradvies
1 bolus 2 weken voor inseminatie.

Conseil d'alimentation
1 bolus 2 semaines avant insémination.

Fütterungshinweise
1 Bolus 2 Wochen vor der Besamung.

Feeding recommendation
1 bolus 2 weeks before insemination.



Samenstelling / Composition / Zusammensetzung / Composition

Calciumcarbonaat / Carbonate de calcium / Calciumcarbonat / Calciumcarbonate
Magnesiumfosfaat / Phosphate de magnésium / Magnesiumphosphat / Magnesium phosphate
Dicalciumfosfaat / Phosphate dicalcique / Dicalciumphosphat / Dicalcium phosphate
Marine Phytoplankton Algenpoeder / Poudre d'algues de phytoplancton marin / Marine Phytoplankton Algen Pulver / Marine Phytoplankton Algae Powder (Nannochloropsis gaditana)

Nutritionële toevoegingsmiddelen / Additifs nutritionnels / Ernährungszusatzstoffe / Nutritional additives	**per / par / pro / per kg**	**gem. dag. afgifte / libération moy. quot. / durchschn. tägliche Freisetzung / average daily release**
Bètacaroteen / Bêta-carotène / Beta-Carotin / Beta-carotene (3a160a)	200 g	0,45 g
Vitamine A / Vitamin A (3a672a)	4.300.000 IU	9.675 IU
Vitamine D3 / Vitamin D3 (3a671)	7.500.000 IU	16.875 IU
Vitamine E / Vitamin E (d-alpha-tocoferol-acetate) (3a700)	22.000 IU	50 IU

Analytische bestanddelen / Composants analytiques / Analytische Bestandteile / Analytical components	
Ruw eiwit / Protéine brute / Rohprotein / Crude protein	0,0 %
Ruw vet / Matières grasses brutes / Rohfett / Crude fat	10,6 %
Ruwe vezel / Fibre brute / Rohfaser / Crude fibre	0,7 %
Ruw as / Cendres brutes / Rohasche / Crude ash	46,0 %
Natrium / Sodium / Natrium / Sodium	0,0 %
Magnesium / Magnésium / Magnesium / Magnesium	10,3 %
Calcium / Calcium / Calcium / Calcium	5,3 %
Fosfor / Phosphore / Phosphor / Phosphorus	6,5 %
Vocht / Humidité / Feuchtigkeit / Humidity	6,7 %

Aanbevolen wordt om voor gebruik het advies van een dierenarts of nutritionist in te winnen. / Il est recommandé de demander conseil à un vétérinaire ou à un nutritionniste avant utilisation. /
Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes oder Ernährungswissenschaftlers einzuholen. / It is recommended to seek advice from a veterinarian or nutritionist before use.
Lotnummer / Numéro de lot / Chargennummer / Lot number – Tenminste houdbaar tot / Utiliser de préférence avant le / Mindestens haltbar bis / Expiry date: Zie verpakking / Voir emballage / Siehe Verpackung / See packaging.

Inhoud / Contenu
Inhalt / Content

8 x 90 g

AMINO ANIMAL CARE

Koel en droog bewaren / Conserver au frais et au sec / Kühl und trocken lagern / Store cool and dry.
Amino Animal Care – Belgium. amino@telenet.be – www.amino.jouwweb.be
FCA Nr. 06/565 Amino BV - Prod ID: PDV500465

Feed Chain Alliance • together for safety and quality

Amino Fertility Bolus_v05.20NlFrDeEn